NOTE XXVIII.

COLÉOPTÈRES DU SZÉ-TCHOUEN ET DE KOUI-TCHÉOU (CHINE)

PAR

L. FAIRMAIRE.

Onthophagus angulatus Redt.

Deux individus du Szé-tchouen se rapportent à la description et à la figure de Redtenbacher. Mais chez l'un les expansions du corselet sont plus développés et l'angle latéro-postérieur dépasse fortement les bords latéraux en formant presque un crochet très pointu. La tête n'est pas aussi triangulaire que l'indiquent le texte et la figure, elle est plus obtuse, plus ogivale, les carènes transversales sont aussi fortes l'une que l'autre, toutes deux légèrement arquées; les élytres ont des stries à peine enfoncées et légèrement ponctuées. Malgré ces quelques différences je crois bien que cet insecte appartient à l'espèce de Redtenbacher que j'avais déjà signalée du Yunnan.

L'autre individu est au contraire moins grand et moins développé, les angles latéraux se rapprochent davantage de la figure donnée par Redtenbacher.

Ochodæus grandiceps, n. sp.

Long. 8 mill. — Ovatus, convexus, rufus, rufovillosulus, vix nitidulus, prothorace macula media baseos, scutello elytrisque macula humerali, vitta fere mediana transversa, marginem haud attingente et macula transversa apicali

fuscis; capite lato, fere planato, dense subtiliter rugosulo, paulo inæquali, clypeo antice bituberoso; prothorace brevi, valde transverso, elytris paulo latiore, antice arcuatim angustato, dorso subtiliter densissime ruguloso, basi medio oblonge foveolato, margine postico ante angulos sinuato, his paulo obtusis; scutello oblongo, dense punctato; elytris sat brevibus, lateribus arcuatis, densissime subtiliter ruguloso, parum fortiter punctato-striolatis, stria 5^a punctis tantum indicata; pygidio planiusculo, subtilissime vix perspicue ruguloso; subtus cum pedibus longius villosus, his validis, tibiis anticis apice fortiter bidentatis.

Hab. Szé-tchouen.

Remarquable par sa large tête, son chaperon plus prolongé, portant à l'extrémité deux tubercules bien marqués, les angles postérieurs du corselet saillants et les taches des élytres.

Geotrypes substriatellus, n. sp.

Long. 20 mill. — Ovatus, convexus, niger, parum nitidulus, elytris anguste obscuro-cœrulescente marginatis; capite summo breviter et antice sat dense punctato, inter oculos fere lævi, sutura clypeali valde angulata, clypeo antice rotundato, medio paulo elevato, antennarum clava fuliginosa; prothorace transverso, elytris haud angustiore, antice angustato, lateribus parum arcuatis, dorso subtiliter, lateribus densius ac evidentius punctato, utrinque foveola nitida impresso, basi fere recta, utrinque depressa et margine interrupto, angulis obtuse rotundatis, anticis obtusissimis; scutello ogivali, fere lævi, margine obsolete plicatulo; elytris ad humeros sat angulatis, dorso subtiliter punctulato-lineolatis, callo humerali polito; pedibus validis, carinatis, tibiis anticis valde tridentatis et supra paulo denticulatis, femoribus latis, posticis basi obtuse angulatis, trochanteribus paulo productis.

Hab. Szé-tchouen.

Ressemble au *scutellatus* Fairm., du Yunnan, mais beau-

coup plus grand, plus noir, plus mat, avec le chaperon moins rugueux, plus relevé au milieu, l'écusson pas plus brillant que le reste du corps, les élytres à lignes ponctuées fines mais distinctes et les fémurs postérieurs angulés.

Toxocerus Riaultii, n. sp.

Long. 14 mill. — Oblongo-elongatus, sat fortiter convexus, capite prothoraceque cupreo-metallicis, illo dense rufo-villoso, hoc lateribus anguste cyanescentibus et rufo-villosis, scutello cupraceo, apice cyanescente, elytris rufis, nitidis, subtus cum pedibus cœruleus, nitidus, sat longe sat dense fulvido-villosus; capite oblongo, parallelo, dense subtiliter rugosulo, lateribus elevatis, apice truncato, antennis fulvis, clava castanea, arcuata, funiculo haud longiore; prothorace longitudine haud latiore, elytris angustiore, antice et postice æqualiter angustato, lateribus arcuatis, dorso sat subtiliter dense punctato-ruguloso, angulis anticis vix obtusis, posticis fere rotundatis; scutello elongato, rugosulo, pubescente; elytris oblongis, ad humeros sat rotundatis, postice post medium leviter attenuatis, apice rotundatis, dorso densissime subtiliter punctatis, sutura et utrinque lineolis 2 vix distincte elevatis; subtus dense subtiliter rugulosus, pedibus sat validis, femoribus punctatis, tibiis scabratis cum tarsis obscurioribus, intermediis apice dilatatis, pedibus posticis longioribus, tibiis apice dilatatis et valde bicalcaratis.

Hab. Koui-tchéou.

Bien plus étroit que le *T. Rothschildii* Fairm., du Kashmir, la tête et le corselet sont cuivreux, plus étroits, les élytres sont rousses, bien plus longues et plus finement rugueuses et les antennes sont bien plus courtes.

Ectinoplia nigrotincta, n. sp.

Long. 9 mill. — Ressemble extrêmement à la *triplagiata* Fairm., du Thibet, par la forme et la disposition générale des couleurs, en diffère par le corselet et les élytres un peu plus courts, le premier noir, avec une bande circummarginale, une ligne médiane et deux taches discoïdales d'un jaune soufre pâle, les élytres également noires avec le sommet de l'écusson, la suture et 3 bandes étroites transversales, ne touchant pas le bord externe, la postérieure plus courte, ne touchant pas la suture, d'un jaune soufre pâle, le dessous du corps, le pygidium et les pattes sont d'un jaune soufre presque mat, les pattes plus brillantes, les tibias et les tarses assez dénudés, au lieu de la belle teinte dorée de *triplagiata*.

Hab. Szé-tchouen.

Homaloplia abbreviata, n. sp.

Long. 6 à 7 mill. — Ovata, postice sat ampliata, apice truncata, fusco-picea, fere nigra, nitida; capite dense rugosulo-punctato, summo læviore, antice truncato, lateribus et antice reflexo-marginato, inter oculos transversim sulcatulo; prothorace transverso, basi elytris haud angustiore, antice paulo angustato, dorso dense punctulato, ad latera impresso et paulo rugosulo, margine postico latissime arcuato, angulis posticis fere obtusis; scutello ogivali, punctato; elytris ovatis, postice ampliatis, apice abrupte rotundatis, fere truncatis, sat fortiter punctulato-striatis, intervallis vix convexiusculis, grosse ruguloso-punctatis, striis suturam versus profundioribus, extus et præsertim apice obsolescentibus, stria suturali apice profundiore; pygidio convexo, subtiliter punctulato; subtus cum pedibus magis picea, tarsis dilutioribus, tibiis anticis valde bidentatis.

Hab. Szé-tchouen.

Ressemble assez à *Serica diabolica* Reitt., de Syrie, mais glabre, bien plus fortement ponctuée et striée, avec les pattes plus robustes.

Homaloplia discoidalis, n. sp.

Long. 6 à 7 mill. — Ovata, sat convexa, cœrulescenti-fusca, parum nitida, lateribus pilosula, elytris rufis, sutura et margine externo fusco-cœrulescentibus, apice conjunctis

et plus minusve dilatatis, parte rufa interdum basali aut tota deficiente; capite ruguloso-punctato, summo læviore, antice subtruncato, antice et lateribus minus reflexo, parce piloso; prothorace transverso, elytris haud aut vix angustiore, antice rotundatim angustato, dorso cœrulescentimicante et parce punctato, margine postico late arcuato, angulis posticis obtusis; scutello ogivali, basi depresso et paulo punctato; elytris ovatis, postice haud ampliatis, apice separatim rotundatis, punctulato-striatis, intervallis sat convexis, striis apice extremo obliteratis; pygidio fere lævi; subtus fortiter punctata, metasterno medio lævi et micante, abdomine laxe et longe pallido-setuloso, pedibus validis, interdum rufescentibus, tibiis anticis bidentatis, posticis compressis, latis, tarsis elongatis.

Hab. Szé-tchouen.

Ressemble beaucoup à notre *ruricola*, en diffère par le corselet moins court, moins ponctué, à côtés moins arrondis en avant, l'écusson presque lisse, les élytres un peu plus fortement striées, le pygidium et surtout le propygidium bien moins ponctués, le premier presque lisse, et les tibias postérieurs plus larges. La coloration du disque des élytres est d'un rouge plus sombre.

Trigonophorus Riaultii, n. sp.

Long. 30 mill. — Oblongo-subquadratus, parum convexus, glaber, totus nitide metallico-viridis; capite antice concavo, ante oculos sinuato, antice truncato et laminatim elevato, lamina leviter bisinuata et utrinque angulata, parte concava leviter rugulosa, utrinque valde elevata, antice constricta, fronte in lobo horizontali obtuso, planato medio producta; prothorace transverso, elytris paulo angustiore, antice a medio rotundatim angustato, dorso laxe sat subtiliter punctato, ad angulos posticos fortius et impressiusculo, his sat rotundatis, margine postico medio vix sensim sinuato; scutello acute triangulari, parce punctulato; elytris a basi leviter attenuatis, apice fere truncatis, sed extus

rotundatis, dorso sat subtiliter punctatis, basi fere lævibus, sutura a medio et utrinque costis 2 sat elevatis, his basi et externa apice obliteratis, medio intervallis leviter depressis et fortius punctatis, levissime rugulosis; pygidio transversim dense subtiliter strigosulo, medio longitudinaliter paulo elevato et utrinque impressiusculo, apice cum margine supero abdominis rufo-ciliato; subtus coriaceo-punctatus, pectore et femoribus anticis sat dense, abdomine parce rufo-villosis, pedibus validis, grosse punctatis, tibiis anticis latis, valde tridentatis, metasterno medio sulcato, processu sat acute prolongato.

Hab. Koui-tchéou.

Ce bel insecte diffère des espèces connues du même genre par la sculpture des élytres et surtout par l'armature du chaperon qui est tronqué et relevé en lame courte et large. Mais les *T. Feæ* et *foveiceps* Gestro (Annal. Mus. Genova, Juin 1891) montrent de telles modifications dans les appendices du chaperon qu'il est permis de penser qu'on trouvera encore des formes transitoires où le lobe antérieur s'élargira peu à peu comme il a déjà diminué de hauteur.

Rhomborhina japonica Hope.

Je ne puis rapporter qu'à cette espèce un certain nombre d'individus recueillis au Szé-tchouen; je ne trouve aucune différence avec ceux du Japon si ce n'est que quelques rares exemplaires ont la saillie mésosternale moins parallèle, un peu étranglée avant l'extrémité, l'intercoxale est également très obtuse et large. La coloration est d'un assez beau vert médiocrement brillant.

Rhomborhina vernicata, n. sp.

Long. 27 mill. — Ressemble extrêmement à la précédente pour la forme et la coloration; mais les élytres ne sont pas sensiblement atténuées en arrière et paraissent plus carrées, la couleur est extrêmement brillante, comme vernissée; la tête est un peu plus étroite, moins fortement rugueuse, le bord antérieur est moins tronqué, plus largement arrondi aux angles, la massue des antennes est un peu plus longue que le funicule; les élytres sont un peu plus fortement ponctuées, plus longues et impressionnées longitudinalement sur le disque; la saillie intercoxale est assez courte mais aiguë au lieu d'être presque tronquée et la saillie métasternale est moins arrondie à l'extrémité qui est nettement séparée par une suture transversale, en même temps le sillon métasternale est bien moins profond. Les 4 tibias postérieurs sont aussi velus au côté interne et aux antérieurs la dent supérieure est plus près de l'extrémité; les tarses sont également bruns.

Une seule ♀ du Szé-tchouen.

Ressemble aussi à l'*Anomalocera Mearsii*, mais bien plus grande avec la saillie intercoxale différente.

Rhomborhina diffusa, n. sp.

Long. 30 mill. — Ressemble à *R. Mellyi*, mais un peu plus grande et d'une coloration un peu moins brillante, d'un vert moins éclatant, teinté légèrement d'un reflet rougeâtre, plus largement sur le corselet; l'abdomen est aussi un peu rougeâtre par bandes transversales. La tête est également anguleuse, mais avec les côtés droits, parallèles, plus nettement relevés et le bord antérieur est à peine arrondi aux angles; les côtés du corselet sont plus visiblement ponctués, les élytres sont bien plus ponctuées, surtout vers le bord externe et à l'extrémité, avec l'angle sutural saillant. En dessous, le corps est également lisse, sauf sur les côtés de l'abdomen, la saillie intercoxale est aussi triangulaire et aiguë, la mésosternale plus courte, plus large, plus arrondie; les tibias antérieurs sont étroits, la dent apicale est courte, un peu arquée en dehors, et la tranche externe présente une faible sallie anguleuse peu distincte, la massue des antennes est plus longue que le funicule et brune.

Hab. Szé-tchouen; un seul ♂.

Rhomborhina maculicrus, n. sp.

Long. 28 mill. — Ressemble beaucoup à *R. hyacinthina* Hope, même coloration d'un brun très foncé, un peu olive, très brillant, mais avec tous les fémurs ornés en dessus d'une bande d'un jaune d'ocre brillant, n'atteignant pas tout-à-fait l'extrémité. La taille est plus faible et le corps un peu moins large, mais la tête est très différente: elle est peu élargie en avant, assez concave, surtout au vertex, rugueuse, avec les côtés droits, très relevés, et le bord antérieur plus fortement relevé au milieu de sorte que, vu d'en haut, il fait paraître le devant du chaperon obtusément saillant; au milieu une ligne longitudinale un peu élevée; le corselet n'a qu'une ponctuation indistincte, sauf sur les côtés, et surtout les angles postérieurs où elle est assez forte, ceux-ci sont plus arrondis, la sinuosité du milieu de la base est très faible; les élytres sont très finement ponctuées, l'impression transversale derrière l'écusson est à peine distincte; le pygidium est plus finement et plus transversalement rugueux et cilié de poils roux; en dessous l'abdomen est assez fortement ponctué partout et la poitrine est assez finement ponctuée, la saillie métasternale est bien plus étroite, non élargie en spatule et garnie de poils roux, les pattes sont rugueusement ponctuées et les tibias antérieurs ont 3 larges dents.

Hab. Szé-tchouen.

Callynomes Helleri, n. sp.

Long. 11 mill. — Oblongus, subparallelus, ater, nitidulus, prothorace pube squalide grisea anguste circumdato, elytris utrinque paulo ante medium et prope suturam striga transversali brevi, paulo post medium striga simili ad marginem externum et paulo ante apicem striga simili brevi suturali, vitta marginali apice dilatata cinerea; capite lato, fortiter sat dense punctato, subtiliter cinereo-pubescente; summo. lævi, clypeo nitido, lævi, antice late arcuato et sat fortiter reflexo, integro; prothorace transverso, elytris angustiore, lateribus valde rotundato, angulis posticis late rotundatis, anticis obtusis, dorso fortiter minus dense punctato; scutello acuto, depresso, fortiter punctato, lateribus elevatis; elytris oblongis, ad humeros rotundatis, postice levissime attenuatis, fortiter sat dense punctatis, punctis disco oblongis ad latera rotundis, minoribus et densioribus, parte apicali cinerea rugosa; pygidio haud gibboso, ocellato-punctato, fortiter marginato, griseo, fusco punctato; subtus cum pedibus nitidus, lateribus fortiter punctatus, epimeris supra griseo marginatis, metapleuris rugosis, antice grisescentibus, abdomine lateribus griseo maculoso, tibiis anticis bidentatis.

Hab. Szé-tchouen.

Ressemble à l'*obsoletus* Fairm., mais plus grand, plus large, moins rugueux avec le corselet plus grossement ponctué, plus large, le chaperon entier, formant en avant une gouttière transversale lisse et brillante, les tibias antérieurs bidentés; les dessins des élytres sont à peu près les mêmes, mais le corselet est bien différent ainsi que le dessous du corps.

Paralichas striolatus, n. sp.

Long. 7 à 9 mill. — Cette espèce ressemble beaucoup au *P. bimaculatus* Guér. pour la forme et l'ensemble de la coloration; mais les lignes ponctuées des élytres sont plus marquées avec les points plus gros, les intervalles sont moins unis, tout le corps est couvert d'une pubescence plus grosse, plus longue, plus épaisse, les bandes rouges, aussi bien sur le corselet que sur les élytres, sont plus roussâtres et ces dernières présentent des bandes intermédiaires un peu moins distinctes; la ♀ est notablement plus grande que le ♂ et sa coloration est la même tandis que chez le *bimaculatus* la ♀ a les élytres unicolores et les articles des antennes sont bien moins acuminés.

Hab. Szé-tchouen.

Eulampyris basicrus, n. sp.

Long. 18 mill. — Forme et coloration d'*E. bivitrea* Fairm., du Japon, en diffère par le corselet plus arrondi en avant et surtout aux angles postérieurs, la partie discoïdale basilaire est seule d'un roux orangé, le reste est roussâtre, la ligne médiane est semblable, un peu plus saillante, les 2 taches diaphanes sont les mêmes; l'écusson est roux, un peu déprimé au milieu; les élytres sont plus étroites, presque droites sur les côtés, à peine déhiscentes à l'extrémité; le dessous est entièrement d'un fauve moins roussâtre, les pattes sont brunes, sauf la moitié basilaire des fémurs qui est roussâtre; l'abdomen est à peu près semblable.

Hab. Szé-tchouen.

Lamprophorus scutatus, n. sp.

Long. 15 mill. — Forme et coloration du *L. Boyei* Motsch., mais avec les élytres encore plus effacées aux épaules et leur extrémité plus arrondie; le corselet est plus arrondi sur les côtés avec les angles postérieurs largement arrondis, ne dépassant qu'à peine la base, la partie discoïdale brune est bien limitée sur les côtés avec une tache brunâtre en dehors, la partie transparente antérieure est bien plus claire, les côtés ont une bordure d'un fauve pâle, presque transparente, étroite, se prolongeant sur toute la base; l'écusson est roussâtre, plus étroit; les élytres sont un peu plus courtes, plus arrondies sur les côtés, leur sculpture est la même; le dessous est d'une roussâtre sale, uniforme, les pattes sont brunâtres avec la base des fémurs roussâtre; l'avant-dernier segment dorsal de l'abdomen est également lobé de chaque côté, le dernier est légèrement sinué au milieu, arrondi de chaque côté, les segments ventraux sont les mêmes.

Hab. Szé-tchouen.

Nyctobates parallelus, n. sp.

Long. 18 à 20 mill. — Sat elongatus, parallelus, convexus, niger, nitidus; capite subtiliter punctato, antice truncato, sutura clypeali medio recta, utrinque obliqua, oculis fere integris, antennis modice validis, prothoracis medium vix attingentibus, articulis 5 ultimis paulo crassioribus et pubescentibus, articulo 3° sequenti paulo longiore; prothorace transverso, elytris paulo angustiore, antice et postice fere æqualiter et parum angustato, lateribus leviter arcuatis, antice cum angulis rotundatis, postice vix sensim sinuatis, dorso subtiliter punctulato, basi utrinque late sinuata, angulis sat acutis; scutello obtuso, vix punctulato; elytris oblongis, parallelis, ad humeros sat angulatis, modice striatis, striis subtiliter punctulatis, apice lævibus, intervallis planiusculis, lævibus, 5° basi intus arcuato, paulo convexo et interdum cum 1° conjuncto; prosterno inter coxas sulcato, lateribus subtiliter plicatulo, mesosterno late impresso, pedibus mediocribus, tibiis fere rectis.

Hab. Szé-tchouen.

Remarquable par sa forme parallèle qui ne le rapproche que du *striatifrons* Fairm., du Kiang-si; mais ce dernier en diffère beaucoup par les stries du front, les stries des élytres fortement ponctuées et les tibias arqués.

Cyriogeton pernitidus, n. sp.

Long. 17 mill. — Oblongo-ovatus, postice ampliatus, valde convexus, totus nitidissime æneus, supra vix sensim, subtus cum pedibus magis cœrulescens; capite dense subtiliter punctulato, oculis approximatis, antennis gracillimis, corporis medium paulo superantibus, articulo 4° sequenti fere duplo longiore, penultimis brevioribus, ultimo brevissimo; prothorace parum transverso, elytris valde angustiore, antice paulo magis quam basi angustato, dorso fere lævi, indistincte punctulato, angulis anticis valde obtusis, margine postico vix bisinuato, angulis vix rectis; scutello ogivali, polito; elytris breviter ovatis, postice ampliatis et apice obtuse rotundatis, humeros subrotundato-angulatis, dorso fere lævibus, punctulis vix distinctis seriatim lineatis; subtus subtiliter dense punctulatus, abdomine subtiliter strigosulo, pedibus sat magnis, femoribus anticis subtus medio angulatis.

Hab. Szé-tchouen.

Ce bel insecte est fort intéressant en ce qu'il fait une transition entre le genre *Cyriogeton* et les *Plesiophthalmus*, dont il ne diffère que par le corps plus court, plus ramassé, les élytres non striées, plus convexes; il diffère des *Cyriogeton* par le corps un peu moins court, les pattes plus longues, les antérieures égales aux autres, les tibias non arqués.

Plesiophthalmus amplipennis, n. sp.

Long. 13 à 17 mill. — Ovato-oblongus, postice ampliatus, convexus, niger, nitidus; capite subtiliter dense punctulato, sutura clypeali impressa, antennis parum gracilibus, corporis medium attingentibus, apice picescentibus, articulo 3° duobus sequentibus conjunctis fere æquali; prothorace transverso, elytris haud angustiore, antice rotundatim angustato, dorso indistincte, lateribus evidentius punctulato, basi recta, angulis obtusis, anticis deflexis; scutello late triangulari, lævi; elytris ovatis, basi attenuatis, post medium ampliatis, apice obtusis, humeris fere nullis, parum profunde punctulato-striatis, intervallis dense subtiliter punctulatis, epipleuris lævibus; subtus cum pedibus paulo nitidior, densissime punctulatus, prosterno sulcato, mesosterno lævi, profunde bisulcato, abdomine basi leviter striolato, pedibus modice elongatis, femoribus anticis subtus dense triangulari plus minusve evidente armatis; ♂ minor, postice vix ampliatus, prothorace angustiore, lateribus basi magis rotundatis, elytrorum interstriis convexiusculis; ♀ major, postice ampliata, prothorace basi lateribus fere rectis, interstriis planis.

Hab. Szé-tchouen.

Ressemble beaucoup à l'*ovipennis* Fairm., mais le corselet a les angles antérieurs non saillants, les élytres sont un peu plus courtes, plus élargies en arrière, moins fortement striées, avec les intervalles à peine convexes ou plans, et les pattes plus longues.

Borboresthes, n. g.

Ce nouveau genre est extrêmement voisin des *Allecula* et n'en diffère que par des caractères assez lègers; mais le nombre des espèces de ce genre est tel qu'il faut chercher à le subdiviser. Le genre actuel diffère notablement par le faciès qui est presque ovalaire, le corselet étant aussi large à la base que les élytres, ces dernières un peu oblongues. Les yeux sont à peine visiblement sinués; l'écusson est large, court, très obtus; le prosternum est étroit, le mésosternum à peine un peu concave à la base et caréné en avant, la saillie intercoxale est allongée, assez aiguë; les pattes sont plus courtes et les fémurs postérieurs sont beaucoup plus courts que les élytres; les tarses ont les deux avant-derniers articles lamellés.

Outre l'espèce décrite ci-après ce nouveau genre comprendrait l'*Allecula cruralis* Mars., du Japon.

Borboresthes fuliginosus, n. sp.

Long. 8 à 9 mill. — Ovato-oblongulus, convexus, nuceus, nitidulus, dense rubiginoso-villosulus; capite prothoraceque subtiliter densissime granulosis, antennis gracilibus, corporis medium paulo superantibus, articulis 3—11 fere æqualibus, palpis maxillaribus articulo ultimo late triangulari; prothorace transverso, elytris haud angustiore, a basi antice sat fortiter arcuatim angustato, margine postico medio truncato, utrinque paulo sinuato, angulis posticis obtusis, anticis valde deflexis; scutello obtuse triangulari, leviter granuloso; elytris oblongo-ovatis, apice obtusis, dorso punctulato-striatis, intervallis paulo convexiusculis, subtiliter dense rugosulis; subtus dense subtiliter rugosulus, minus villosulus, pedibus mediocribus, femoribus sat latis.

Hab. Szé-tchouen.

La vestiture de la partie supérieure du corps cache beaucoup la sculpture et donne à cet insecte un faciès assez spécial.

Prionus laminicornis, n. sp.

Long. 33 mill. — Oblongus, paulo elongatus, sat convexus, castaneo-piceus, nitidus; capite sat dense punctato, inter oculos rugoso, medio sulcatulo, clypeo truncato, transversim plicato, labro rufo-villoso, antennis parum validis, articulo 1° crasso, 3° duobus sequentibus conjunctis æquali, apice incrassato et paulo producto, carinato, articulis 4—10 carinatis, apice laminato-dilatatis, ultimo simplici, acuto; prothorace brevissimo, elytris valde angustiore, dense subtiliter punctato, ante marginem posticum transversim plicato, utrinque sat late leviter impresso, lateribus antice dentibus 2 acutis, secunda majore, angulo postico breviter sat acute angulato; scutello transverso, apice obtuse rotundato, lævi, nitidissimo; elytris oblongis, a medio postice attenuatis, sat dense parum fortiter ruguloso-punctatis, basi lævioribus, utrinque tricostulatis, costulis basi obliteratis, apice obsolescentibus, angulo suturali haud producto; pectore subtilissime coriaceo, fulvo dense sed breviter pilosulo, abdomine nitidiore, lævi, lateribus impresso, pedibus validis, tibiis scabratis.

Hab. Szé-tchouan.

Ce *Prionus* ressemble beaucoup au *P. Delavayi* Fairm., du Yunnan, décrit sur un individu assez immature sous le rapport de la coloration; mais ce dernier est notablement plus petit, avec la tête et le corselet très rugueux, ce dernier ayant les angles latéraux moins aigus et le postérieur effacé, l'écusson est aussi rugueux, les élytres sont plus rugueuses et les côtes longitudinales sont encore moins marquées et leur angle sutural est plus saillant; enfin les lobes des articles antennaires sont plus courts, plus larges et plus arrondis à l'extrémité chez la nouvelle espèce.

Oberea incompleta, n. sp.

Long. 15 mill. — Ressemble extrêmement à la *brevicollis* Fairm.; même forme, même genre de coloration, en diffère par les élytres dont le bord marginal est bien plus droit et qui se rétrécissent peu à peu et légèrement après la base, avec la ponctuation plus fine, un peu plus serrée, avec deux légères côtes peu saillantes et une bande marginale assez large, d'un brun foncé, courant le long du bord externe sans atteindre l'extrémité, ne laissant qu'un petit espace roux sous l'épaule, à la base de l'épipleure, le segment anal est concolore, les tarses sont bruns avec l'extrémité des tibias.

Hab. Szé-tchouen.

Ces insectes, fort intéressants, ont été recueillis en Chine par Mr. Riault et j'en dois la communication, par l'entremise de Mr. Donckier, à l'obligeance de Mr. Guerry-Duperay dans la collection duquel ils se trouvent.

Paris, Décembre 1897.